REVUE ARCHEOLOGIQUE DE PICARDIE

Trimestriel - **N° 1-2 1989/110 F.**



- Les gisements mésolithiques du ''Bois de Saponay'' (Aisne)
- Les bracelets néolithiques dans le Nord de la France, la Belgique et l'Allemagne rhénane
- La faune et l'industrie osseuse de l'enceinte de Maizy (Aisne)
- L'environnement floristique de Villeneuve-Saint-Germain (Aisne) à La Tène finale

ETUDE ANTHROPOLOGIQUE DES RESTES HUMAINS FOUILLES DE FOSSES NÉOLITHIQUES A MAIZY (AISNE)

par Michel CHARPENTIER *

A - Identification et description des restes crâniens

1) MGA 83 - 1.1552, l. 3669, l. 3673, l. 3523, l. 1331

Partie supérieure d'une calva ; celle-ci a été coupée en arrière de la suture coronale qui est complètement manquante. La reconstitution a été réalisée à partir de 13 fragments.

Peu de mensurations possibles :

- largeur maximum (8) : 138 mm,
- longueur de la mastoïde (Porion-Astérion) : 46 mm,
- épaisseur des os (sur la suture sagittale dans la ''pars bregmatica'') : 7,3 mm.

La mastoïde est petite, la crête sus-mastoïdienne bien marquée et l'inion de type 3 (Broca).

En *norma verticalis,* la partie observable est ovo-pentagonoïde. Présence d'un os wormien lambdatique (os épactal).

Sexe : indéterminé.

Age : 30-39 ans.

2) MGA 83 - 2.2629

Fragment de maxillaire gauche comprenant les alvéoles 21à 25. L'alvéole 21 contient encore la racine de la dente cassée probablement *post-mortem,* aucune trace d'usure n'étant visible. Les autres alvéoles sont vides. L'os alvéolaire n'étant pas résorbé, les dents ont certainement disparu *post-mortem.*

Le palais est peu profond.

3) MGA 83 - 1.2371 et 1.2378

Ces deux fragments forment un ensemble d'environ 10 cm x 10 cm appartenant à un os frontal. La cassure a ouvert les sinus frontaux.

Au niveau des bosses frontales, l'épaisseur moyenne des os est de 7,8 mm.

4) MGA 83 A 26/27 4248

Fragment de pariétal gauche de 60 mm x 53 mm.

Epaisseur de l'os au niveau de la bosse pariétale : 6,7 mm.

5) MGA 83 - 1.349

Fragment de pariétal droit et de frontal de 42 mm x 42 mm. Le segment de suture coronale visible montre la fin de la ''pars bregmatica'' et le début de la ''pars complicata'' sur 2 cm pour chacune d'elle. Aucune trace de synostose tant sur la face exocrânienne que sur la face endocrânienne.

Epaisseur de l'os : 6 mm.

6) MGA 83 - 1.2329

Fragment de frontal (7 cm x 5 cm).

Epaisseur de l'os au niveau de la bosse frontale droite : 4,5 mm.

L'épaisseur et l'aspect évoquent un frontal d'enfant (la crête frontale - *crista frontalis* - est peu prononcée).

Remarque :

Une lacune demi-circulaire de 20 mm de diamètre est située à 30 mm à gauche de la gouttière sagittale. Cette lacune est incomplète car l'os est fracturé à ce niveau.

La table externe est découpée comme à l'emporte-pièce. Les cellules du diploë sont ouvertes. La table interne est décollée sur 5 mm en moyenne sur tout le pourtour de l'orifice ; le périoste semble avoir été arraché, ce qui ne peut se produire que sur un os frais.

* Rue du Château - 02150 SISSONNE.

FRONTAL



Face exocrânienne

Face endocrânienne

CONCLUSION

L'absence d'autres fragments crâniens permet d'envisager deux hypothèses :

a) traumatisme crânien ayant peut-être provoqué l'éclatement du frontal.

b) prélèvement d'une rondelle osseuse obtenue par découpage de la table externe perpendiculairement à la surface de l'os jusqu'au diploë, puis enfoncement de la rondelle ayant provoqué la rupture de la table interne et un arrachement du périoste, ce qui impose que le crâne fût encore frais.

B - Identification des restes du squelette appendiculaire

1) MGA 82 - 1.3680

Fibula droite sans ses extrémités.

2) MGA 83 - 1.669

Fibula droite sans ses extrémités.

3) MGA 83 - 1.1017

Extrémité distale de premier métatarsien gauche. Adulte.

4) MGA 82 - 1.3668

Phalange proximale d'hallux. L'épiphyse proximale n'étant pas encore synostosée, il s'agit d'un adolescent ou d'un adulte jeune de moins de 22 ans (cette épiphyse se synostose en général entre 15 et 22 ans).