LE CAMP CHASSÉEN DU MONT D'HUETTE A JONQUIÈRES (OISE)

IV - La faune

Thérèse POULAIN*

V - LA FAUNE

Les ossements d'animaux dont nous avons effectué l'étude proviennent des secteurs I, X, XIV et XVII.

Nous y avons dénombré 4619 fragments osseux dont 2518 déterminables, appartenant à un nombre minimum de 150 animaux domestiques et sauvages :

bœuf de petite race *(Bos brachyceros Rütimeyer)*
porc *(Sus domesticus L.)*
mouton *(Ovis aries L.)*
chèvre *(Capra hircus L.)*
chien *(Canis familiaris L.)*
grand bœuf sauvage *(Bos primigenius L.)*
cerf élaphe *(Cervus elaphus L.)*
chevreuil *(Capreolus capreolus L.)*
cheval *(Equus caballus L.)*
sanglier *(Sus scrofa L.)*
ours brun *(Ursus arctos L.)*
renard *(Vulpes vulpes L.)*
castor *(Castor fiber L.)*
lièvre *(Lepus europaeus Pallas)*
oiseaux : canard colvert *(Anas platyrynchos L.)*
autour des palombes *(Accipiter gentilis L.)*
batracien : grenouille *(Rana sp.)*

soit :

secteur	N. total de fragts	N. de fragts déterminables	Nombre d'individus	A. dom	A. sauv.
I	82	70	9	8	1
X	10	2	1	1	
XIV	3495	1968	102	77	25
XVII	1032	478	38	29	9

Nous étudierons la faune par secteurs, puis effectuerons des comparaisons entre eux, afin d'établir un panorama général de ce site.

SECTEUR I

Il a livré 82 fragments osseux dont 70 déterminables, appartenant à 9 animaux domestiques et sauvages : bœuf, porc, mouton, sanglier

soit :

animaux domestiques :	69 fragments, 8 individus, 88,89 %
animaux sauvages :	1 fragment , 1 individu , 11,11 %

dont la répartition est la suivante :

animaux	Nombre de fragments	Nombre d'individus	Age
bœuf	39	3	1 j, 2 ad.
porc	18	2	adultes
mouton	12	3	1 j, 2 ad.
sanglier	1	1	adultes

Toutes les espèces domestiques, et celles que nous trouvons dans les autres secteurs, appartiennent aux petites races des tourbières.

a) le bœuf :

39 fragts dont un seul mensurable : 1 omoplate g (cavité glénoïde ; Hauteur = 58 mm ; largeur = 50 mm).

Ses restes sont répartis entre les différentes parties du squelette :

membre postérieur = 16 fragts (fémur, 2 ; tibia, 4 ; métatarsien, 2 ; 1 calcaneum d, 2 g ; 1 naviculaire d ; 2 phalanges I, 2 ph. II)
membre antérieur = 7 fragts (humérus, 4 ; radius, 2 ; 1 métac. g)
ceintures = 2 fragts d'1 omoplate g.
vertèbres = 7 (1 atlas, 2 cervicales, 2 dorsales, 3 fragts)
côtes = 5
mandibule = 1 droite (avec les 3 molaires)
dent inférieure = 1 Pm2 droite.

Des marques de décarnisation et découpage ainsi que des traces de carbonisation sur le naviculaire.

b) le porc :

18 fragments de 2 adultes :

membre postérieur = 4 (1 tibia d, 2 fragts de tibia, 1 ph. II)
membre antérieur = 3 (1 humérus d ; 1 cubitus d, 1 g.)
ceintures = 1 os iliaque
vertèbres = 4 (1 atlas, 2 dorsales, 1 sacrum)
côte = 1 fragts
maxillaire sup. = 1 gauche (entier)
mandibule = 1 fragt droit
dents supérieures = 3 (1 canine d ; 1 pince g ; 1 M2 g)

Des marques de découpage et de carbonisation (vertèbre dorsale).

c) le mouton :

12 fragments d'1 jeune d'environ 1 an et 2 adultes.

* Chargée de Recherches au C.N.R.S., rue du Collège 89 Avallon

membre supérieur = 3 fragts (1 tibia d, 1 g ; 1 fragt de fémur)
membre antérieur = 2 fragts (1 humérus d ; 1 de métacarpien)
vertèbre = 1 atlas
côte = 1 fragt
fragts crâniens = 3 (1 symphise inférieure sans dents ; 2 branches montantes de mandibules)
dents inférieures = 2 (1 pince d ; 1 M2 d).

Des marques de découpage.

d) le sanglier :

Un fragment d'1 gros adulte : 1 tête cubitale droite.

En résumé : le **secteur 1** a livré quelques fragments d'un petit nombre d'animaux essentiellement domestiques, parmi lesquels le bœuf et le mouton occupent la première place.

SECTEUR X

Il n'a livré que 10 fragments osseux dont 2 déterminables, appartenant à un *bœuf* de petite taille, adulte :
1 fragt d'1 M2 inférieure droite,
1 M3 supérieure g.

SECTEUR XIV

Nous y avons dénombré 3495 fragments osseux dont 1968 déterminables, appartenant à 102 animaux domestiques et sauvages : bœuf, porc, mouton, chèvre, chien, gd bœuf, cerf élaphe, chevreuil, cheval, sanglier, ours brun, renard, castor, lièvre, oiseaux (canard colvert, autour).

Animaux	Nombre de fragments	Nombre d'individus	% d'individus
bœuf	1357	42	41,17 %
porc	158	13	12,74 %
mouton	199	15	14,70 %
chèvre	11	3	2,94 %
chien	71	4	3,92 %
gd bœuf	59	4	3,92 %
cerf élaphe	21	3	2,94 %
chevreuil	1	1	0,98 %
cheval	1	1	0,98 %
sanglier	73	10	9,80 %
ours brun	1	1	0,98 %
renard	7	1	0,98 %
castor	2	1	0,98 %
lièvre	4	1	0,98 %
oiseaux	3	2	1,96 %

Les animaux domestiques prédominent avec 75,50 %. Parmi eux, le bœuf représente 41,17 %, précédant les ovicapridés (17,64 %), le porc (12,74 %) et le sanglier (9,80 %).

AGE

Les adultes représentent les 3/4 de la faune ; parmi eux des adultes âgés ou même très âgés :

animaux	très jeunes	jeunes	adultes
bœuf	4	9	29
porc	2	2	9
mouton	3	4	8
chèvre			3
chien			4
grand bœuf			4
cerf élaphe			3
chevreuil			1
cheval			1
sanglier			10
ours brun			1
renard			1
castor			1
lièvre			1
oiseaux			2

soit :
9 très jeunes = 8,82 %
15 jeunes = 14,70 %
78 adultes . = 76,47 %

REPARTITION DES VESTIGES

1 - Animaux domestiques

a) le bœuf

Animal de petite taille, issu du petit bœuf des tourbières, il est représenté par 42 individus :
4 très jeunes (2 de 2-3 mois, 2 de 4-5 mois),
9 jeunes (2 de 12-15 mois, 4 de 18 à 20 mois, 3 de 2 ans 1/2)
29 adultes dont 4 assez jeunes.

De très nombreux fragments mensurables : (1)
1 *omoplate* g (cavité glénoïde), H = 58 mm ; l = 48 mm
3 *tibias,* ext. distales d :
DAP = 42, 47, 48 mm
DT = 60, 67, 68 mm
3 *tibias,* ext. distales g :
DAP = 46, 47, 49 mm
DT = 62, 66, 68 mm
9 *métatarsiens,* ext. proximales, g :
DAP = 40, 42, 43, 44, 44, 46, 48, 51, 51 mm
DT = 45, 46, 45, 45, 45,5, 49, 52, 51, 50 mm
7 *métatarsiens,* ext. proximales, d :
DAP = 42, 46, 46, 47, 47, 48, 48,5 mm

(1)Abréviations :
fragt = fragment
L = Longueur
l = largeur
H = hauteur
DAP = diamètre antéropostérieur
DT = diamètre transverse
ext. = extrémité.

DT = 43, 48, 50, 48, 49, 50, 47,5 mm
2 *métatarsiens,* ext. distales d :
DAP = 31, 31 mm
DT = 53, 56 mm
4 *métatarsiens,* ext. distales g :
DAP = 30, 31, 32,5, 33 mm
DT = 55, 53,5, 53, 53 mm
2 *naviculaires,* g :
DAP = 51, 55 mm
DT = 57, 61 mm
1 *calcaneum,* d :
H = 70 mm, l = 42 mm
8 astragales, d : L = 66, 65, 63, 70,5, 66, 66, 69, 69,5 mm
l = 39, 40, 41, 41,5, 43, 44, 45, 45,5 mm
7 *astragales g,* L = 67, 68, 70, 68,5, 70, 72, 70 mm
l = 41, 42, 42, 42, 44, 44, 46 mm
1 *humérus* d, ext. distale :
DAP = 42 mm
DP = 63 mm
3 *humérus* g, ext. distale :
DAP = 43, 45, 47 mm
DT = 71, 76, 79 mm
2 *radius* d, ext. proximales :
DAP = 36, 37 mm
DT = 64, 70 mm
4 *radius* g, ext. proximales :
DAP = 37, 37,5, 41, 42 mm
DT = 63, 71, 74, 77 mm
1 *radius* d, ext. distale :
DAP = 41 mm
DT = 69 mm
1 *radius* g, ext. distale :
DAP = 35 mm
DT = 61 mm
1 *métacarpien* droit, entier :
L = 197 mm
ext. proximale, DAP = 32,5 mm DT = 53 mm
ext. distale, DAP = 28 mm DT = 54 mm
7 *métacarpiens* d, ext. proximale :
DAP = 31, 32, 32,34, 35, 40, 41 mm
DT = 48, 53, 50, 55, 55, 64, 67,5 mm
7 *métacarpiens* g, ext. proximales :
DAP = 31, 33, 34, 34, 35, 35, 36 mm
DT = 53, 55, 57, 54, 59, 64 mm

Ces vestiges sont répartis sur l'ensemble du squelette ; ils sont au nombre de 1357 :

membre postérieur (2)	285
membre antérieur	285
ceintures	95
vertèbres	135
côtes	148
sternèbre	1
fragts crâniens	144
chevilles osseuses	56
mandibules	10
maxillaires sup.	2
dents inférieures	96
dents supérieures	100

De très nombreuses marques de découpage, de carbonisation (métacarpien), de morsures de carnivores (métatarsien g), d'arthrose (radius g, phalanges).

b) le porc :

158 fragments de 13 individus :
2 très jeunes (d'environ 3-4 mois)
2 jeunes (1 de 18-20 mois, 1 de 2 ans-2 ans 1/2)
9 adultes dont 1 assez jeune
2 fragments mensurables :
2 extrémités distales de *tibias* gauches :
DAP = 25, 25,5 mm
DT = 30, 31 mm

membre postérieur (3)	38
membre antérieur	41
ceintures	7
vertèbres	11
côtes	13
fragts crâniens	35
mandibule	1
maxillaire sup.	3
dents inférieures	6
dents supérieures	3

De nombreuses marques de découpage et décarnisation ; des traces de carbonisation (cubitus d, vertèbres, fragts crâniens) et des morsures de carnassiers.

c) le mouton :

199 fragments de 15 individus :
3 très jeunes de 2 à 3 mois
4 jeunes de 10 mois à 1 an
8 adultes (dont 1 bélier)
Des fragments mensurables :
1 *tibia* gauche, ext. distale :
DAP = 18 mm
DT = 25 mm
1 *métatarsien* g, ext. proximale :
DAP = 17 mm
DT = 18 mm
1 *humérus* droit, ext. distale :
DAP = 18 mm

(2) *S.XIV = le bœuf :*
membre postérieur = 285 fragts (fémur, 37 ; tibia, 87 ; 1 os malléolaire ; métatarsien, 72 ; 1 rotule ; 5 naviculaires ; 20 calcaneums ; 25 astragales ; 3 gds cunéiformes ; 19 ph. I ; 9 ph. II ; 5 ph. III ; 1 gd sémamoïde postérieur) ;
membre antérieur = 285 fragts (humérus, 72 ; radius, 81 ; cubitus, 25 ; métacarpien, 62 ; 17 ph. I ; 7 ph. II ; 21 os du carpe)
ceintures = 95 fragts (bassin, 45 ; omoplate, 50)
vertèbres = 135 (5 axis, 16 atlas, 13 cervicales, 42 dorsales ; 14 lomabaires, 3 sacrums, 42 fragts).

(3) *S.XIV = le porc :*
membre postérieur = 38 fragts (fémur, 14 ; tibia, 15 ; 3 péronés ; 1 métatarsien IV ; 1 ph. I, 1 ph. II, 1 ph. III ; 2 calcaneums)
membre antérieur = 41 fragts (humérus, 23 ; radius, 9 ; cubitus, 3 ; 1 ph. I latérale ; 5 métacarpiens)
ceintures = 7 fragts (bassin, 5 ; omoplate, 2)
vertèbres = 11 (2 atlas, 2 cervicales, 4 dorsales, 3 fragts).

DT = 26 mm
1 *métacarpien* gauche, ext. proximale :
DAP = 15 mm
DT = 21 mm

membre postérieur (4)	51
membre antérieur	35
ceintures	3
vertèbres	10
côtes	58
fragts crâniens	27
mandibules	4
maxillaire sup.	1
dents inférieures	2
dents supérieurs	8

Des marques de décarnisation et découpage, de carbonisation (diaphyse de métacarpien). Des fragments de métatarsiens façonnés en poinçons.

d) la chèvre :

11 fragments de 3 adultes dont 1 âgé et 1 très, très âgé :
2 *humérus* (d et g)
3 fragts de *côtes*
les chevilles osseuses d. et g. d'1 adulte
1 *mandibule* gauche (les 3 M, très très usées)
3 *dents supérieures* (Ml g et M2 d, ad âgé), M3 d (ad.).

Des marques de découpage.

e) le chien :

71 fragments de 4 adultes
Ce sont essentiellement des fragts crâniens et dentaires.
2 *tibias* (d et g),
1 *os iliaque* g
adulte n° 1 :
le maxillaire supérieur g (avec la M2)
le maxillaire supérieur d (sans dents)
le sphénoïde, le condyle occipital d ;
les condyles temporaux d et g,
l'occipital, 50 petits fragts crâniens
adulte n° 2 :
les maxillaires supérieurs et frontaux g et d (avec les Pm3, Pm4, M1, M2 g et d)
la mandibule d (avec le Pm3, Pm4, M1 et M2)
adulte n° 3 :
le maxillaire supérieur g (avec les I2, I3, C, Pm2)
le maxillaire supérieur d (I2, I3, C)
la mandibule g (Pm4, M1, M2)
adulte n° 4 :
1 mandibule g (C, Pm2, Pm3, Pm4, M1 brisée)
les fragts de mandibule d (Pm2, Pm3, M1 et C)

(4) *S.XIV = le mouton :*
membre postérieur = 51 fragts (tibia, 19 ; fémur, 21 ; métatarsien, 9 ; 1 astragale, 1 calcaneum)
membre antérieur = 35 fragts (humérus, 13 ; radius, 15 ; cubitus, 2 ; 4 métacarpiens, 1 ph. II)
ceintures = 3 fragts (bassin, 2 ; omoplate, 1)
vertèbres = 10 (1 atlas, 1 cervicale, 1 dorsale, 7 fragts).

2 - Animaux sauvages

Ils sont variés, mais représentés par un petit nombre d'animaux.

a) le grand bœuf :

59 fragments de 4 adultes, dont un assez jeune.
D'assez nombreux fragments mensurables :
1 *astragale* g, L = 74 mm ; l = 50 mm
1 *naviculaire* g :
DAP = 51 mm
DT = 57 mm
1 *métatarsien* d, ext. proximale :
DAP = 52 mm
DT = 53 mm
1 *métatarsien g, ext. proximale :*
DAP = 56 mm
DT = 57 mm
1 métatarsien g, ext. distale :
DAP = 32 mm
DT = 53 mm
1 *humérus* g, ext. proximale :
DT = 93 mm
1 *humérus* d, ext. distale :
DAP = 42 mm
DT = 74 mm
2 *radius* d, ext. proximales :
DAP = 46, 47 mm
DT = 86, 86 mm
2 *radius* g, ext. proximales :
DAP = 45, 58 mm
DT = 88, 88 mm
2 *radius* d, ext. distales :
DAP = 50, 60 mm
DT = 77, 83 mm
1 *radius* g, ext. distales :
DAP = 54 mm
DT = 80 mm
1 *omoplate* d, cavité glénoïde :
H = 62 mm ; l = 58 mm

membre postérieur (5)	15
membre antérieur	26
ceintures	2
vertèbres	2
côtes	8
fragts crâniens	4
mandibules	2

Des marques de découpage, un fragment brûlé ; le bord inférieur d'1 mandibule dépourvue de dents.

b) le cerf élaphe :

21 fragments de 3 adultes, trois mensurables :
1 *naviculaire* g :

(5) *S.XIV = le grand bœuf :*
membre postérieur = 15 fragts (fémur, 4 ; métatarsien, 6 ; 1 astragale, 1 naviculaire, 2 calcaneums, 1 ph.I)
membre antérieur = 26 fragts (humérus, 6 ; radius, 12 ; cubitus, 3 ; 1 os du carpe (scaphoïde) ; 4 ph.I ; 2 ph.III)
ceintures = 2 fragts (1 os iliaque, 1 omoplate)
vertèbres = 2 (1 dorsale, 1 lombaire).

DAP = 45 mm
DT = 47 mm
1 *radius* g, ext. proximale :
DAP = 28 mm
DT = 48 mm
1 *métacarpien* d, ext. distale :
DAP = 30,5 mm
DT = 45 mm

membre postérieur (6 fragts) :
2 naviculaires, 2 phalanges I, 1 phalange II, 1 phalange III
membre antérieur (5 fragts) :
1 radius g, 1 métacarpien d, 2 phalanges II, 1 phalange III
côte (1 fragt)
bois (5 fragts) :
4 fragts de perche, 1 pointe d'andouiller, très usée, dont la partie externe a été enlevée
dent inférieure (1 coin d)
dents supérieures (2 M2 gauches)
1 maxillaire sup. g avec la Pm2

Le métacarpien présente un sciage au-dessus des poulies distales.

c) le chevreuil :

Un seul fragment : 1 bois de chasse brisé.

d) le cheval :

Un fragment : l'extrémité distale d'un métacarpien gauche.

e) le sanglier :

73 fragments de 10 adultes de forte taille ; parmi eux, quelques restes mensurables :
1 *tibia* d, ext. distale :
DAP = 28 mm
DT = 32 mm
3 *astragales* g :
L = 44, 46, 49 mm
l = 23, 26, 27 mm
1 *astragale* d :
L = 53 mm
l = 30 mm
1 *radius* g, ext. proximale :
DAP = 26 mm
DT = 35,5 mm
2 *radius* g, ext. distales :
DAP = 27, 29 mm
DT = 36, 40 mm
1 *M3* inférieure gauche :
L = 40 mm
l = 18 mm

membre postérieur (6)	17
membre antérieur	26
bassin	9
vertèbres	4
côtes	2
fragts crâniens	8
maxillaire sup.	1
mandibules	3
dents inférieures	2
dent supérieure	1

Des marques de découpage.

f) l'ours brun :

L'astragale gauche d'1 adulte.

g) le renard :

7 fragments d'1 adulte :
1 *tibia* g
1 *cubitus* d
2 *vertèbres* (l'atlas et 1 caudale)
les maxillaires supérieures g. et d. (les Pm1 g et d, la Pm3 g) manquent
l'intermaxillaire sup. g. avec le coin
la carnassière inférieure d.

Des marques de décarnisation sur le tibia.

h) le castor :

2 molaires inférieures droites.

i) le lièvre :

4 fragments d'1 adulte :
2 fragts de diaphyse fémorale, l'épiphyse distale du fémur g
1 métacarpien II g.

j) les oiseaux :

3 fragments de 2 oiseaux :
1 *canard colvert :* les diaphyses humérale et cubitale gauches d'1 adulte
1 *autour des palombes :* le cubitus gauche.

En résumé : c'est le **secteur XIV** qui a livré le plus grand nombre de vestiges et d'animaux, dont les 3/5 appartiennent à des espèces domestiques. Le bœuf y occupe la première place, précédant les ovicapridés.

La faune sauvage est variée, mais la chasse n'est orientée que vers quelques espèces : sanglier, grand bœuf, cervidés. La présence des autres espèces paraît liée au hasard des rencontres plus qu'à une recherche déterminée.

SECTEUR XVII

Nous y avons dénombre 1032 fragments osseux dont 478 déterminables, appartenant à 38 animaux domestiques et sauvages : bœuf, porc, mouton, grand bœuf, cerf élaphe, cheval, sanglier, renard et grenouille.

(6) S.XIV = le sanglier :
membre postérieur = 17 fragts (fémur, 3 ; tibia, 5 ; 4 calcaneums, 4 astragales, 1 ph.III)
membre antérieur = 25 fragts (humérus, 13 ; radius, 6 ; cubitus, 3 ; 3 ph.I)
ceintures = 9 fragts d'os iliaques
vertèbres = 4 (1 atlas, 3 dorsales).

soit :

animaux domestiques :	
457 fragments osseux, 29 individus, 76,32 %	
animaux sauvages :	
21 fragments osseux, 9 individus, 23,68 %	

Animaux	Nombre de fragments	Nombre d' individus	% d'individus
bœuf	370	17	44,73 %
porc	41	5	13,15 %
mouton	46	7	18,42 %
grand bœuf	3	2	5,26 %
cerf élaphe	6	2	5,26 %
cheval	1	1	2,63 %
sanglier	6	2	5,26 %
renard	4	1	2,63 %
grenouille	1	1	2,63 %

Les animaux domestiques représentent les 3/4 de la faune ; parmi eux, le bœuf prédomine avec 44,73 %, précédant de très loin le mouton et le porc. La faune sauvage est peu abondante.

AGE

Les adultes sont prépondérants

Animaux	très jeunes	jeunes	adultes
bœuf	2	4	11
porc		2	3
mouton		1	6
gd bœuf		1	1
cerf		1	1
cheval			1
sanglier		1	1
renard			1
grenouille			1

soit :
2 très jeunes = 5,26 %
10 jeunes = 26,30 %
26 adultes = 68,42 %

REPARTITION DES VESTIGES

1 - Animaux domestiques

a) le bœuf :

370 fragments de 17 individus :
2 très jeunes de quelques mois
4 jeunes (2 de 12-15 mois, 2 de 2 ans-2 ans 1/2)
11 adultes (dont 1 assez jeune).
Des fragments mensurables :
1 *tibia* g, ext. proximale :
DAP = 83 mm
DT = 75 mm
1 *tibia* d, ext. distale :
DAP = 44 mm
DT = 66 mm
1 *métatarsien* d, ext. proximale :
DAP = 46 mm
DT = 47 mm
4 *métatarsiens* g, ext. proximale :
DAP = 41, 45, 45, 51 mm
DT = 42,4, 46, 46, 50 mm
1 *métatarsien* g, ext. distale :
DAP = 31 mm
DT = 51 mm
1 *astragale* g :
L = 69 mm ; l = 42 mm
2 *astragales* d :
L = 65, 68 mm ; l = 40, 45 mm
2 *radius* d, ext. proximales :
DAP = 40, 42,5 mm
DT = 72, 72,5 mm
4 *métacarpiens* d, ext. proximales :
DAP = 32, 35, 37, 37 mm
DT = 54, 61, 62, 66 mm
1 *métacarpien* g, ext. distale :
DAP = 35 mm
DT = 69 mm

membre postérieur (7)	106
membre antérieur	79
ceintures	24
vertèbres	36
côtes	36
fragts crâniens	19
dents inf.	24
dents sup.	46

Des marques de découpage, des traces de dents de carnivores.

b) le porc :

41 fragments de 5 individus :
2 jeunes (1 de 10-15 mois, 1 de 2 ans—2 ans 1/2)
3 adultes
Un fragment mensurable :
l'extrémité distale d'1 *tibia* g :
DAP = 35 mm
DT = 30 mm

membre postérieur (8)	9
membre antérieur	12
ceintures	7
vertèbres	5
côtes	3
fragts crâniens	1
dent inf.	1
dents sup.	3

Des marques de découpage (en particulier sur un humérus gauche), et de carbonisation.

c) le mouton :

46 fragments de 7 individus :
1 jeune d'environ 1 an,
6 adultes dont 1 assez jeune.

membre postérieur (9)	10
membre antérieur	8
ceintures	3
vertèbres	3
sternèbre	1
fragts crâniens	2
côtes	10
mandibule	1
dents inf.	6
dents sup.	2

Des marques de découpage.

2 - Animaux sauvages

a) le grand bœuf :

3 fragments d'1 jeune de 18 mois-2 ans et 1 adulte
1 calcaneum d
1 phalange II postérieure (ad)
la poulie distale désépiphysée d'1 jeune.

Des marques de découpage.

b) le cerf élaphe :

6 fragments d'1 jeune d'environ 8 mois et 1 adulte.
Un fragment mensurable :
1 *métacarpien* g, ext. distale :
DAP = 29 mm
DT = 40 mm

Parmi ces fragments :
1 *tibia* g, ext. distale brisée
1 *naviculaire* g (avec le gd cunéiforme soudé)
l'ext. distale d'1 *métacarpien* g
1 *phalange* III antérieure
1 *pointe d'andouiller* brisée
le bourgeon d'1 *M1* supérieure

Des marques de découpage.

c) le cheval :

1 fragment d'*os iliaque* (pubis et ischion gauches).

d) le sanglier :

6 fragments d'1 jeune de 18 mois-2 ans et 1 adulte dont 1 mensurable :
1 *calcaneum* d
1 *métatarsien* central (désépiphysé)
1 *radius* g, ext. proximale :
DAP = 20 mm
DT = 30 mm
l'extrémité distale d'1 *radius* g (désépiphysé)
1 *cubitus* g
1 *M2* supérieure d.

Des marques de découpage.

e) le renard :

4 fragments d'1 adulte :
1 *tibia* g
1 *métatarsien* III g
2 *côtes*

f) la grenouille :

1 *vertèbre* lombaire.

En résumé : le **secteur XVII** a livré un nombre relativement important de vestiges, parmi lesquels domine le bœuf (370 fragts sur 478). Les animaux domestiques représentent les 3/4 de la faune, le bœuf étant prépondérant (44,73 %). Le mouton occupe la seconde place avec un peu plus de 18 %, précédant de peu le porc (13 %). La chasse est peu importante et ne porte que sur un faible nombre d'animaux.

CONCLUSION

L'habitat chasséen du Mont d'Huette à Jonquières (Oise) a livré, au cours de ses fouilles, 4619 fragments osseux dont **2518** déterminables, représentant un nombre minimum de **150** animaux domestiques et sauvages :

bœuf, porc, mouton, chèvre, chien,
grand bœuf, cert élaphe, chevreuil, cheval, sanglier, ours brun, renard, castor, lièvre, oiseaux (canard colvert, autour des palombes), grenouille.

Ils proviennent pour la majorité des secteurs XIV et XVII qui ont fourni à eux seuls 2446 des 2518 fragments déterminables (97,14 %) et 140 des 150 animaux (93,33 %).

Le **secteur I** a livré 9 animaux dont 8 domestiques (porc, bœuf, mouton) et 1 sauvage (sanglier) ; le **secteur X,** un seul bœuf ; pourtant bien que leur faune soit aussi restreinte, elle présente des similitudes avec celle des **secteurs XIV et XVII** :

- espèces domestiques prédominantes ;
- présence d'animaux appartenant aux petites races des tourbières ;
- prépondérance du bœuf sur les autres espèces.

A ces caractères, s'en ajoutent d'autres propres aux **secteurs XIV et XVII** :

(7) *S.XVII = le bœuf :*
membre postérieur = 106 fragts (fémur, 16 ; tibia, 31 ; 1 rotule, métatarsien, 31 ; 4 ph.I ; 5 ph.II ; 1 ph.III ; 11 calcaneums ; 6 astragales)
membre antérieur = 79 fragts (humérus, 29 ; radius, 19 ; cubitus, 3 ; métacarpien, 15 ; 8 ph.I ; 2 ph.II ; 3 os du carpe)
ceintures = 24 fragts (bassin, 14 ; omoplate, 10)
vertèbres = 36 (1 axis, 1 atlas, 7 cervicales, 12 dorsales, 4 lombaires, 2 sacrums, 9 fragts).

(8) *S.XVII = le porc :*
membre postérieur = 9 fragts (fémur, 1 ; tibia, 3 ; 1 calcaneum, 1 astragale ; 1 ph.I ; 1 ph.II latérale)
membre antérieur = 12 fragts (humérus, 5 ; radius, 3 ; cubitus, 3 ; 1 métacarpien III)
ceintures = 7 fragts (bassin, 4 ; omoplate, 3)
vertèbres = 5 (1 atlas, 1 cervicale, 1 dorsale, 2 fragts).

(9) *S.XVII = le mouton :*
membre postérieur = 10 fragts (fémur, 2 ; tibia, 7 ; 1 rotule)
membre antérieur = 8 fragts (humérus, 6 ; radius, 2)
ceintures = 3 fragts (bassin, 1 ; omoplate, 2)
vertèbres = 3 (1 dorsale, 2 fragts).

- les animaux domestiques y forment les 3/4 de la faune (S.XIV = 75,5 % ; S.XVII = 76,32 %)
- les espèces sauvages sont variées mais axées principalement sur quelques espèces (grand bœuf, cerf élaphe, cheval, sanglier, renard), les autres n'ayant qu'un rôle très secondaire,
- les animaux domestiques comprennent le bœuf, le porc, le mouton, et, dans le secteur XIV, la chèvre et le chien,
- leurs vestiges et ceux de quelques animaux sauvages attestent de leur utilisation alimentaire : traces de découpage, carbonisation (cuisson ?), d'autres de leur utilisation comme outils : dans le secteur XIV par exemple, 2 métatarsiens de moutons ont été façonnés en poinçons, 1 diaphyse tibiale de bœuf en lissoir, 1 pointe d'andouiller présente des marques d'usure, en outre un métacarpien de cerf a été scié à la base ; il en est de même dans le secteur XVII (métacarpien gauche de cerf scié ; andouiller utilisé),
- quelques fragments ont été mordus ou rongés par des carnivores.

Le bœuf est prépondérant dans tous les niveaux ; il représente 33,3 % dans le secteur I, 100 % dans le secteur X, 41,17 % et 44,73 % dans les secteurs XIV et XVII, soit un peu moins de la moitié de la faune ; le mouton est l'égal du bœuf dans le secteur I, mais ne représente que 14,50 et 18,42 % dans les secteurs XIV et XVII, tandis que le porc ne dépasse pas 13,15 % dans le niveau XVII.

L'activité des habitants de Jonquières est donc essentiellement liée à l'élevage.